

## SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija	Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą	Kategorijos apibūdinimas	Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1	2	3	4
<b>1 kategorija</b>	Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai	<b>Gyvybei grėsmingi atvejai:</b>  gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Širdies sustojimas.</li> <li>2. Kvėpavimo sustojimas arba asfiksija.</li> <li>3. Gresiantis kvėpavimo nustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.</li> <li>4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis &lt; 8 k./min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo dažnis &lt; 10 k./min.</li> <li>5. Suaugusiųjų sistolinis arterinis kraujo spaudimas (toliau – AKS) &lt;80 mmHg, kūdikis/vaikas ištiktas dekompensuojamojo šoko.</li> <li>6. Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal <i>Glasgow</i> komų skalę (toliau – GCS) &lt; 9 balų.</li> <li>7. Stebimi viso kūno traukuliai.</li> <li>8. Intraveninis medikamentų arba narkotikų perdozavimas su hipoventiliacija ir hemodinamikos sutrikimu.</li> <li>9. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.</li> </ol>
<b>2 kategorija</b>	Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.  Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu	<b>Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei pavojinga būklė,</b>  kai paciento būklė sunki arba blogėja taip sparčiai, kad yra potenciali grėsmė jo gyvybei arba gresia organų nepakankamumas, jei medicinos pagalba nebus pradėta teikti per 10–15 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, <b>arba atvejai, kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme,</b>  kai reikalingas ypatingai skubus gydymas (trombolizė, antidotai), nuo kurio poveikio gali priklausyti klinikinės baigties rezultatai,  <b>arba ypatingai stipraus skausmo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kritiška kvėpavimo takų būklė – stridoras arba patologinis seilėtekis.</li> <li>2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.</li> <li>3. Ūmus kraujotakos sutrikimas. <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. šalta, drėgna, „marmurinė“ oda, bloga perfuzija (kapiliarų prisipildymo laikas &gt; 5 s);</li> <li>3.2. suaugusiųjų širdies susitraukimų dažnis (toliau – ŠSD) &lt; 50 k./min. arba &gt; 150 k./min., naujagimių ŠSD &lt;100 k./min. arba &gt;200 k./min., kūdikių ŠSD &lt; 80 k./min. arba &gt; 200 k./min., vaikų iki 8 m. ŠSD &lt; 60 k./min. arba &gt;180 k./min.;</li> <li>3.3. hipotenzija su audinių perfuzijos sutrikimu.</li> </ol> </li> <li>4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25% cirkuliuojančio kraujo kiekio arba daugiau) netekimas.</li> <li>5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų širdies, pilvo, danties skausmą ar ektopinį nėštumą, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.</li> <li>6. Gliukozės kiekis kraujyje &lt; 2 mmol/l.</li> <li>7. Miegoistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS &lt; 10 balų).</li> <li>8. Karščiavimas arba bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais.</li> <li>9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.</li> <li>10. Politrauma, kai reikalinga skubi organizuota medikų brigados pagalba.</li> <li>11. Ūmi lokali trauma – didžiųjų kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai, amputacijos.</li> <li>12. Didelės rizikos anamnezė: <ol style="list-style-type: none"> <li>12.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas;</li> </ol> </li> </ol>

		<p><b>atvejai,</b></p> <p>kai reikia per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą</p>	<p>12.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas;</p> <p>12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).</p> <p>13. Psichikos ir elgesio sutrikimai:</p> <p>13.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;</p> <p>13.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.</p>
<b>3 kategorija</b>	<p>Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą</p>	<p><b>Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,</b></p> <p>jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,</p> <p><b>arba kitos būklės,</b></p> <p>kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,</p> <p>arba kai reikia per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais objektyviais širdies-kraujagyslių ir/ar centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.</li> <li>Vidutiniškai sunkus nukraujavimas dėl bet kokios priežasties.</li> <li>Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS &lt; 13 balų).</li> <li>Oksigenacija &lt; 90 procentų.</li> <li>Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.) valandų anamnezėje.</li> <li>Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.) vėmimas.</li> <li>Ūmi dehidratacija.</li> <li>Galvos trauma su trumpalaikiu sąmonės netekimu.</li> <li>Vidutinio stiprumo skausmas, išskyrus danties skausmą, vertinamas 7–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubaus nuskausminimo.</li> <li>Ūmus pilvo skausmas be didelės rizikos požymių, kai pacientui &gt; 65 m., vertinamas ne mažiau kaip 8 balais pagal dešimties balų skalę.</li> <li>Ūmi židininė neurologinė simptomatika.</li> <li>Vidutinio sunkumo galūnės sužalojimas su deformacija, laceracija ar suspaudimo sindromas.</li> <li>Vaikai iki 8 m., kuriems pagal anamnezę ir stebimus klinikinius požymius yra potenciali grėsmė gyvybei.</li> <li>Psichikos ir elgesio sutrikimai: <ol style="list-style-type: none"> <li>mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė;</li> <li>ūmios psichozės;</li> <li>sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį;</li> <li>sunki depresija;</li> <li>ryškus psichomotorinis sujaudinimas.</li> </ol> </li> <li>Kiauryminis akies sužalojimas.</li> </ol>
<b>4 kategorija</b>	<p>Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą</p>	<p><b>Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,</b></p> <p>jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,</p> <p><b>arba kitos būklės,</b></p> <p>kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Šlapimo sulaikymas, anurija.</li> <li>Galvos kaulų traumos, įskaitant žandikaulių ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo.</li> <li>Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).</li> <li>Pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.</li> <li>Traumos ir nelaimingi atsitikimai.</li> <li>Erkių įsisiurbimai.</li> <li>Stiprus (vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) odontogeninis skausmas.</li> <li>Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.</li> </ol>

	<p>Pasiutligės imunoprofilaktika atliekama nedelsiant, kai įkastas, įdrėkostas ar aplaižytas pasiutusį ar įtariamai pasiutusį gyvūnų asmuo kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą</p> <p>Stabligės imunoprofilaktika atliekama nedelsiant, kai susižeidęs asmuo kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą</p> <p>Įsisiurbusi erkė ištraukiama nedelsiant, kai asmuo kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą</p>	<p>atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti sunkios</p> <p>Potenciali apsikrėtimo pasiutligės virusu grėsmė</p> <p>Potenciali apsikrėtimo stablige grėsmė</p> <p>Potenciali apsikrėtimo erkiniu virusiniu encefalitu ir Laimo liga grėsmė</p>	
--	---	---	--

**Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje nurodytos ūmios klinikinės būklės ir skubios medicinos pagalbos teikimo indikacijos laikomos pavojingomis organizmo būklėmis, dėl kurių užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba.**

---