

Ko dar galima tikėtis po danties plombavimo procedūros atlikimo?

- Plombavimo metu dantis bei jame esantis nervinis – kraujagyslinis rezginys (danties pulpa, danties nervas) neišvengiamai patiria įtampą.
- Valant karieso pažeistus audinius, gali būti prieita prie danties pulpos – ją atvėrus, atliekamas dantų šaknų kanalų (endodontinis) gydymas.
- Gilių pažeidimų atvejais, kuomet pulpa dengiama tik plonu danties kietųjų audinių sluoksniu, net ir neatvėrus pulpos, danties nervas gali būti sudirgintas. Išsivysčius danties nervo uždegimui, pacientui taip pat atliekamas endodontinis gydymas.

Esant nuogastavimams, į visus iškilusius neaiškumus Jums atsakys mūsų burnos sveikatos priežiūros specialistai – kvalifikuoti gydytojai odontologai.



Mes visada pasiruošę Jums padėti!

Susisiekiite su mumis:



(8 37) 403 900



Pramonės pr. 31
Baltų pr. 7
Savanorių pr. 369
Mickevičiaus g. 4
A. Juozapavičiaus pr. 72



www.kaunopoliklinika.lt

KAUNO
MIESTO
POLIKLINIKA



Po danties plombavimo

ATMINTINĖ PACIENTAMS

2 val. po procedūros nevalgykite ir negerkite

- Suplombuotas dantis keletą dienų gali būti dirglesnis, aplinkinės dantenos – jautresnės.
- Priklausomai nuo danties būklės ir procedūrai naudotos plombinės medžiagos, plombai gali reikti šiek tiek laiko sustingti, Jums – prie restauracijos „pripasti“.
- Po procedūros neskubėkite valgyti bei gerti – leiskite nurimti sujautrintiems danties bei dantenu audiniams bei plombai sutvirtėti.

Venkite ryškų spalvinį pigmentą turinčių maisto produktų, gļitaus, kieto, karšto bei šalto maisto

- Pirmąją dieną po procedūros, derėtų nevertoti dažančių maisto produktų, galinčių pakeisti plombos spalvą (tokių kaip burokėliai, uogos, raudonas vynas ir pan.).
- Po procedūros taip pat reikėtų vengti lipnaus, kieto maisto, galinčio pažeisti plombą bei sujautrinti neseniai preparuotą („gręžtą“) dantį.
- Siekiant neišprovokuoti dar didesnio dantų dirglumo, pravartu rinktis vidutinės temperatūros minkštus maisto produktus.



Palaukite, kol vietinio anestetiko poveikis baigsis

- Jeigu Jums buvo taikyta vietinė nejautra (nuskausminimas) procedūros metu, prieš valgydami, palaukite, kol „aptirpimo“ pojūtis burnos – veido srityje išnyks.
- Priešingu atveju, visai to neįsąjaukdami, galite įsikąsti ir susižeisti burnos ertmės audinius.
- Anestetiko poveikis įprastai visiškai pranyksta po 3 – 4 val.

Nepamirškite individualios burnos higienos

- Net ir jausdami dantų bei dantenu jautrumą po procedūros, du kartus dienoje švelniai valykite dantis minkštu šepetėliu, pasitelkite tarpdančių priežiūros priemones, valykite liežuvį.
- Kruopštus ir atsakingas dantų valymas padeda pašalinti susikaupusius nešvarumus, greitina dantenu gijimą ir užtikrina gerą burnos sveikatos būklę.



Ko dar galima tikėtis po danties plombavimo procedūros atlikimo?

- Danties plombavimas – intervencinė procedūra, kurios metu išvalomi karieso pažeisti danties audiniai, pašalinami seni nekokybiški užpildai ir danties defektas atkuriamas plombine medžiaga.
- Siekiant geresnės prieigos prie pažeistų danties sričių bei tvaresnio plombos laikumo, gali būti preparuojama („gręžiama“) ir dalis sveikųjų audinių (dažniausiai tai atliekama, nustačius kariesą tarpdančiuose).
- Pasitaiko atvejų, kuomet, iš pažiūros, nedidelis pažeidimas yra išplitęs į gilesnius danties audinius. Tad, procedūros metu, gali būti pašalinta daugiau danties audinių nei pacientas tikėjosi.
- Ženkliai pažeistas dantis taip pat gali skilti. Likus mažai sveikųjų danties audinių, plombavimas nebeatliekamas arba pasitelkiamas tik kaip laikina gydymo alternatyva.